

## Uned 14

### Niwmonia mewn Gwartheg a Defaid

#### Taflen Wybodaeth

Mae niwmonia'n gallu amrywio o ysgafn i ddifrifol, a gall fod yn farwol.

Nid oes un cyflwr mewn gwartheg a defaid y gellir ei alw'n niwmonia.

Fel arfer, mae'r cyflwr yn ganlyniad i gyfuniad o ffactorau rhagdueddol ar fferm e.e. amodau ffisegol, straen ffisiolegol a phathogenau.

Gellir dosbarthu niwmonia yn llym neu'n gronig.

Clefyd **llym** yw clefyd â naill ai un neu ddau o'r canlynol:

1. dechrau sydyn
2. hyd byr (mewn cyferbyniad â chwrs cronig).

Mae clefyd **cronig** yn glefyd sy'n para'n hir neu'n dod yn ôl.

#### Mathau o Niwmonia

##### 6 prif fath:

- iii) firaol
- iv) mycoplasmaidd
- v) bacterol
- vi) parasitig
- vii) ffwngaidd-mycotig
- viii) heb fod yn heintus – cael ei achosi'n fecanyddol e.e. dosio/tiwbiau stumog

#### Niwmonia mewn Gwartheg

Mae gwartheg ifanc mewn mwy o berygl oddi wrth niwmonia

#### Achosion Niwmonia mewn Lloeau

##### 1. Firaol

- *RSV*- firws syncytiol resbiradol
- *PI3* - firws paraffliw
- *IBR* - rhinotracheitis heintus y gwartheg
- *BVD* - dolur rhydd firaol y gwartheg
- Coronafirws.

##### 2. Bacterol

- *Pasteurela multocida* a *Manheimia hemolytica* (*Pasteurela hemolytica* yn flaenorol)
- Actinomysau pyogenaidd

##### 3 Parasitig

- Bronchitis Parasitig achosir gan lyngyr yr ysgyfaint neu hach

##### 4. Mycoplasma

## Niwmonia mewn Defaid

Gall niwmonia mewn ŵyn gael ei achosi gan

- bacteria
- mycoplasma
- firws
- parasit mewnol.

### 1. Achosion Bacterol

Mae Pasteurelosis yn cael ei achosi gan ddau facteriwm

- *Manheimia hemolytica* (*Pasteurela hemolytica* yn flaenorol)
- *Pasteurela trehalosi*.

### 2. Achosion Firaol

Gal 5 math o firws achosi niwmonia mewn defaid

- *PI3* - firws paraffliw
- *RSV* - firws syncytiol resbiradol
- Adenofirysau
- *MV* - maedi visna
- *OPA* - Adenocarcinoma Ysgyfeintiol Defeidiog (a elwir yn Jaagsietke).

### 3. Parasitig

Mae llyngyr yr ysgyfaint yn gallu achosi bronchitis parasitig ac weithiau niwmonia mewn defaid ifanc yn ystod yr haf a'r hydref. Fe'i hachosir gan y llyngyr main - *Dictyocaulus filarial*.

## Ffactorau Rhagdueddol

Ffactorau fferm yw'r rhain sy'n arwain at anifail ifanc yn datblygu niwmonia pathogenaidd. Nid yw'r rhain ar bennau eu hunain yn 'achosi' niwmonia:

- awyriad gwael i loeau dan do
- amodau llaith ac oer
- newidiadau sydyn yn nhymheredd yr aer
- straen oherwydd achosion gwahanol
- cymeriant annigonol colostrwm
- colostrwm o ansawdd gwael
- lloi ifanc o wahanol lefydd yn cymysgu
- mae lloi sydd wedi dioddef o ddolur rhydd hefyd yn fwy tebygol o ddiodeff o glefyd yr ysgyfaint.

## Symptomau Cyffredinol Niwmonia

- rhedlif dyfrllyd o'r trwyn
- colli archwaeth
- dim diddordeb mewn lloeau eraill
- peswch sych
- cyfradd resbiradu gyflymach
- tymheredd wedi codi'n uwch na 39 gradd Celsius.

Mae gan gyflyrau penodol symptomau arbennig e.e. *IBR*, Hach, *Pasteurela*